

MIASIS EN PROLAPSO GENITAL MASIVO: REPORTE DE CASO

Autores: B. D. Durand, R.G. Costanzo, M. L. Gelaf, S. A. Cahaud, I. V. Snger

Instituci3n: Hospital General de Agudos Jos M. Penna (Ciudad Aut3noma de Buenos Aires)

Introducci3n: La miasis es una infecci3n parasitaria causada por larvas de moscas en humanos, de mayor prevalencia en reas tropicales, que puede afectar tejido vivo o necr3tico de diferentes partes del cuerpo, ms frecuentemente piel, conductos auditivo y nasal, siendo rara su presentaci3n en el tracto genitourinario. Se asocia a deficiente higiene personal y ambiental, y trastornos psiquitricos. La base del tratamiento es la extracci3n mecnica de las larvas. Se presenta un caso de miasis en prolapso uterino avanzado y su tratamiento.

Presentaci3n del caso: Paciente femenina de 74 aos, G7P7, diabtica insulino-requiriente e hipertensa cr3nica, concurre por observar larvas en genitales externos. Se constata eversi3n uterina completa, irreductible, con cavidad de 2 x 2 centmetros en mucosa vaginal ulcerada y presencia de larvas vivas en su interior, sin signos de sobreinfecci3n. Parmetros vitales y de laboratorio normales. Se interna y se procede a la extracci3n manual de veinticinco larvas. Se realiza ecografa que no evidencia presencia de larvas en cavidad uterina. Es evaluada por infectologa que indica antibioticoterapia de amplio espectro (Piperacilina-tazobactam). Tras cumplir cinco das de tratamiento antibi3tico se realiza colpocleisis parcial de Le Fort con colpoplastia posterior y perineoplastia, incluyendo la exresis del rea afectada, sin complicaciones intra o postoperatorias mediatas.

Conclusiones: La presencia de miasis en un prolapso genital es una condici3n poco frecuente. La bsqueda bibliogrfica arroja 12 casos publicados, mayormente en pases subdesarrollados. Diferentes sustancias t3picas se han descripto como tratamiento concomitante a la remoci3n de las larvas, sumado al tratamiento antibi3tico en caso de sospecha de sobreinfecci3n. El tratamiento quirrgico definitivo tras resolver la miasis concomitante, ha proporcionado alivio inmediato a la paciente sin mayores complicaciones.